

- الأثارين والأعلاف الكاملة والمتوازنة وفقاً لاحتياجات الغذائية للروبيان
- معدلات احتفاظ أعلى مع ضمان النمو
- ثبات عالي في النوم وجودة مياه قابلة للذوبان
- زيادة مقاومة الجمبري للأمراض والإجهاد البيئي

تحليل المأكولات للمرحلة الابتدائية من الجمبر (SFsh)

SFsh3	SFsh2	SFsh1	واحد	عنوان
1.2-1.8	0.8-1.4	0.3-0.8	mm	حجم المأكولات
37	37	37	Min %	بروتئين خام
3200	3200	3200	Min Kcal/Kg	طاقة قابلة للهضم
12	12	12	Max %	مجموع الدهون
7	7	7	Max %	مجموع الألياف
14	14	14	Max %	رماد الزهرة
1.2	1.2	1.2	Min %	مجموع الفسفور
10	10	10	Max %	رطوبة mois

لائحة التغذية المأكولات لمرحلة الابتدائية من الجمبري (SFsh)

وزن الجمبري (g)	3-5	1-3	1>	اسم الخلاصة
SFsh3	SFsh2	SFsh1		نوع العلف
تنهار	تنهار	تنهار		نسبة التغذية
5-6	6-15	15-30		توازن التغذية
4-5	4-5	4-5		

- الأرقام أعلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقاً لظروف التربة واستراتيجية الإنتاج للمزرعة.
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يومياً عنوان المقر الرئيسي.



- تقليل فترة التكاثر مع زيادة إنتاج المحاصيل
- ثبات عالي في الأعلاف والحفاظ على الماء
- ضمان معدل نمو مرتفع مع نسبة تحويل العلف (FCR)
- زيادة مقاومة الجمبري للأمراض والضغوط البيئية

تحليل الماكولات لمرحلة نمو من الجمبري (GFsh)

عنوان	واحد				
GFsh2	GFsh1				
حجم الماكولات	1.8	1.8	mm		
بروتئين خام	36	36	Min	%	CP
طاقة قابلة للهضم	3100	3100	Min	Kcal/Kg	DE
مجموع الدهون	12	12	Max	%	L
مجموع الألياف	7	7	Max	%	CF
رماد الزهرة	14	14	Max	%	Ash
مجموع الفسفور	1.1	1.1	Min	%	P
رطوبة	10	10	Max	%	mois

طاولة التغذية الماكولات لمرحلة نمو من الجمبري (GFsh)

وزن الجمبري (g)		
GFsh2	GFsh1	اسم الخلاصة
حبيبات مضغوطة	حبيبات مضغوطة	نوع العلف
نسبة التغذية	3-4	3-4
تواتر التغذية	4-5	4-5

- الأرقام أعلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقاً لظروف التربية واستراتيجية الإنتاج للمزرعة.
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يومياً عنوان المقر الرئيسي.



- تقليل فترة التكاثر مع زيادة إنتاج المحاصيل
- ثبات عالي في الأعلاف والحفظ على الماء
- ضمان معدل نمو مرتفع مع نسبة تحويل العلف (FCR)
- زيادة مقاومة الجمبري للأمراض والضغوط البيئية

تحليل الماكولات للمرحلة النهائية من الجمبري (FFsh)

FFsh2	FFsh1	واحد		عنوان		
2.2	2.2	mm		سايز خوراك		
35	35	Min	%	پروتئين خام		
3100	3100	Min	Kcal/Kg	DE	انرژی قابل هضم	
12	12	Max	%	L	چربی کل	
7	7	Max	%	CF	فیبر کل	
14	14	Max	%	Ash	حاکستر کل	
1	1	Min	%	P	فسفر کل	
10	10	Max	%	mois	رطوبت	

طاولة التغذية الماكولات لمرحلة النهائية من الجمبري (FFsh)

>18	12-18	وزن الجمبري (g)
FFsh2	FFsh1	اسم الخلاصة
حبيبات مضغوطة	حبيبات مضغوطة	نوع العلف
1.8-2.5	2.5-3	نسبة التغذية
3-4	3-4	تواتر التغذية

- الأرقام أعلى مقتربة ويجب تحديث كمية العلف وفقاً لظروف التربية واستراتيجية الإنتاج للمزرعة.
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يومياً عنوان المقر الرئيسي.