

- نرخ بازماندگی بالاتر به همراه اطمینان از رشد بهینه
- رشد سریع تر، ضریب تبدیل خوراک کمتر و کاهش ضایعات دفعی

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- افزایش مقاومت بچه ماهی در برابر بیماری و استرس محیطی

آنالیز خوراک آغازین تیلاپیا (SFTi)

عنوان	واحد	SFTi0	SFTi1	SFTi2
سایز خوراک	mm	0.4-1.2	1.7	2.2
پروتئین خام	%	40 ± 2	40	40
انرژی قابل هضم	Kcal/Kg	3600 ± 200	3600	3600
چربی کل	%	Max	14	14
فیبر کل	%	Max	7	7
خاکستر کل	%	Max	14	14
فسفر کل	%	Min	1	1
رطوبت	%	Max	10	10

جدول غذادهی خوراک آغازین تیلاپیا (SFTi)

وزن ماهی (g)	0/003-0/5	0/5-8	8-20
نام خوراک / دما °C	SFTi0	SFTi1	SFTi2
بر اساس اشتها ماهی			
14-17			
17-19	2.1	1.7	1.4
19-21	3.1	2.4	1.9
21-23	4.4	3.4	2.7
23-25	5.5	4.2	3.3
25-27	6.3	4.9	3.8
27-29	8.5	6.5	5
29-31	7.9	6.1	4.7
31-33	4.5	3.5	2.7
33-35	1.9	1.5	1.2
بر اساس اشتها ماهی و O2 آب			
35 >			
دفعات غذادهی	10 >	8-10	8-10

- اعداد فوق پیشنهادی بوده و میزان غذادهی با توجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه برورسانی گردد.
- توصیه های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم ماهی در روز بیان شده است.

آدرس کارخانه:


استان البرز . اشتهارد . شهرک صنعتی کوثر

www.btagro.com

آدرس دفتر مرکزی:

تهران میدان توحید . خیابان پرچم . پلاک ۲۹ . طبقه ۴

شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۵۶۱۸۰۳



- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت واکنش های دفاعی بدن
- سطوح بالای ویتامین، مواد معدنی و فسفولیپیدها جهت مقاومت در برابر تغییرات محیطی

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- افزایش سرعت رشد، کاهش ضریب تبدیل خوراک (FCR) و کاهش طول دوره پرورش

آنالیز خوراک رشد تیلایا (GFTi)

عنوان	واحد	GFTi1	GFTi2
سایز خوراک	mm	3	4
پروتئین خام	%	36	36 ±2
انرژی قابل هضم	Kcal/Kg	3600	3600 ±200
چربی کل	%	16	16 Max
فیبر کل	%	7	7 Max
خاکستر کل	%	14	14 Max
فسفر کل	%	1	1 Min
رطوبت	%	10	10 Max

جدول غذادهی خوراک رشد تیلایا (GFTi)

وزن ماهی (g)	20-50	50-100
نام خوراک / دما °C	GFTi1	GFTi2
بر اساس اشتها ماهی		
14-17		
17-19	1	0.85
19-21	1.3	1.1
21-23	1.8	1.4
23-25	2.2	1.6
25-27	2.9	2
27-29	3.8	2.5
29-31	3.6	2.4
31-33	2.1	1.4
33-35	0.9	0.6
35 <		بر اساس اشتها ماهی و O2 آب
دفعات غذادهی	6	5

- اعداد فوق پیشنهادی بوده و میزان غذادهی با توجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه برورسانی گردد
- توصیه های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم ماهی در روز بیان شده است

آدرس کارخانه:

استان البرز . اشتهارد . شهرک صنعتی کوثر

www.btagro.com

آدرس دفتر مرکزی:

تهران میدان توحید . خیابان پرچم . پلاک ۲۹ . طبقه ۴

شماره تماس : ۰۲۱-۶۶۵۶۱۸۰۳



- قابلیت هضم بالا، کاهش فضولات دفعی و حفظ کیفیت آب
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت واکنش های دفاعی بدن

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- کاهش ضریب تبدیل خوراک (FCR) و دستیابی به اوزان بالا در زمان کوتاه

آنالیز خوراک پایانی تیلایا (FFTi)

عنوان	واحد	FFTi1	FFTi2	FFTi3
سایز خوراک	mm	5	6.5	8
پروتئین خام CP	%	34 ±2	34	34
انرژی قابل هضم DE	Kcal/Kg	3600 ±200	3600	3600
چربی کل L	%	16 Max	16	16
فیبر کل CF	%	7 Max	7	7
خاکستر کل Ash	%	14 Max	14	14
فسفر کل P	%	1 Min	1	1
رطوبت mois	%	10 Max	10	10

جدول غذادهی خوراک پایانی تیلایا (FFTi)

وزن ماهی (g)	100-300	300-500	500<
نام خوراک / دما °C	FFTi1	FFTi2	FFTi3
بر اساس اشتها ماهی			
14-17			
17-19	0.8	0.8	0.75
19-21	1	0.9	0.85
21-23	1.2	1	0.9
23-25	1.3	1.1	1
25-27	1.6	1.3	1.12
27-29	1.9	1.5	1.3
29-31	1.8	1.35	1.2
31-33	1.1	1	0.9
33-35	0.5	0.5	0.5
35<			
بر اساس اشتها ماهی و O2 آب			
دفعات غذادهی	4	3	3

- اعداد فوق پیشنهادی بوده و میزان غذادهی با توجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه برورسانی گردد.
- توصیه های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم ماهی در روز بیان شده است.

آدرس کارخانه:

استان البرز . اشتهارد . شهرک صنعتی کوثر

www.btagro.com

آدرس دفتر مرکزی:

تهران میدان توحید . خیابان پرچم . پلاک ۲۹ . طبقه ۴

شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۵۶۱۸۰۳