



- تقویت سیستم ایمنی و کاهش ناهنجاری‌های اسکلتی
- حاوی سطوح بالای ویتامین‌ها، مواد معدنی، محرک‌های ایمنی و فسفولیپیدها

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- نرخ بازماندگی بالاتر به همراه اطمینان از رشد بهینه

#### آنالیز خوراک آغازین خاویاری (SFSt)

| SFSt4 | SFSt3 | SFSt2 | SFSt1   | SFSt0   | واحد         | عنوان             |
|-------|-------|-------|---------|---------|--------------|-------------------|
| 2.2   | 1.7   | 1.3   | 0.7-1.2 | 0.3-0.7 | mm           | سایز خوراک        |
| 44    | 44    | 44    | 44      | 44      | ±2 %         | CP پروتئین خام    |
| 4100  | 4100  | 4100  | 4100    | 4100    | ±200 Kcal/Kg | DE انرژی قابل هضم |
| 18    | 18    | 18    | 18      | 18      | Max %        | L چربی کل         |
| 7     | 7     | 7     | 7       | 7       | Max %        | CF فیبر کل        |
| 14    | 14    | 14    | 14      | 14      | Max %        | Ash خاکستر کل     |
| 1     | 1     | 1     | 1       | 1       | Min %        | P فسفر کل         |
| 10    | 10    | 10    | 10      | 10      | Max %        | mois رطوبت        |

#### جدول غذادهی خوراک آغازین خاویاری (SFSt)

| 20-30 | 10-20 | 5-10  | 1.5-5 | 0.5-1.5 | وزن ماهی (g)               |
|-------|-------|-------|-------|---------|----------------------------|
| SFSt4 | SFSt3 | SFSt2 | SFSt1 | SFSt0   | نام خوراک / دما °C         |
|       |       |       |       |         | بر اساس اشتها ماهی         |
|       |       |       |       |         | <14                        |
| 2.9   | 3     | 3.2   | 3.5   | 3.8     | 14-16                      |
| 3.5   | 3.5   | 3.7   | 4.1   | 4.6     | 16-18                      |
| 4.1   | 4.3   | 4.5   | 4.7   | 5.6     | 18-20                      |
| 4.2   | 4     | 4.2   | 5.1   | 6.2     | 20-22                      |
| 4.3   | 4.2   | 4.6   | 5.5   | 6.5     | 22-24                      |
|       |       |       |       |         | بر اساس اشتها ماهی و ۲۰ آب |
|       |       |       |       |         | >24                        |
| 8-10  | 8-10  | 8-10  | 8-10  | 8-10    | دفعات غذادهی               |

- اعداد فوق پیشنهادی بوده و میزان غذادهی با توجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه بروز رسانی گردد.
- توصیه‌های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم ماهی در روز بیان شده است.

آدرس کارخانه:

استان البرز . اشتهارد . شهرک صنعتی کوثر

www.btagro.com

آدرس دفتر مرکزی:

تهران میدان توحید . خیابان پرچم . پلاک ۲۹ . طبقه ۴

شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۵۶۱۸۰۳



- توسعه یافته برای افزایش سرعت رشد و کاهش طول دوره پرورش
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت واکنش های دفاعی بدن

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- اطمینان از رشد بهینه ماهی همراه با ضریب تبدیل خوراک پایین

#### آنالیز خوراک رشد خاویاری (GFSt)

| عنوان          | واحد    | GFSt1 | GFSt2 |
|----------------|---------|-------|-------|
| سایز خوراک     | mm      | 3     | 4     |
| پروتئین خام    | %       | 42    | 42    |
| انرژی قابل هضم | Kcal/Kg | 4200  | 4200  |
| چربی کل        | %       | 18    | 18    |
| فیبر کل        | %       | 6     | 6     |
| خاکستر کل      | %       | 14    | 14    |
| فسفر کل        | %       | 1     | 1     |
| رطوبت          | %       | 10    | 10    |

#### جدول غذادهی خوراک رشد خاویاری (GFSt)

| وزن ماهی (g)               | 30-100 | 100-300 |
|----------------------------|--------|---------|
| نام خوراک / دما °C         | GFSt1  | GFSt2   |
| بر اساس اشتها ماهی         |        |         |
| <14                        |        |         |
| 14-16                      | 2.7    | 2.1     |
| 16-18                      | 3.4    | 2.2     |
| 18-20                      | 3.9    | 2.4     |
| 20-22                      | 4      | 2.6     |
| 22-24                      | 4.1    | 2.8     |
| >24                        |        |         |
| بر اساس اشتها ماهی و ۰۲ آب |        |         |
| دفعات غذادهی               | 6-8    | 5       |

- اعداد فوق پیشنهادی بوده و میزان غذادهی با توجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه بروز رسانی گردد
- توصیه های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم ماهی در روز بیان شده است



- پایداری بالای خوراک و حفظ کیفیت آب
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت واکنش های دفاعی بدن

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- کاهش ضریب تبدیل خوراک (FCR) و دستیابی به اوزان بالا در زمان کوتاه تر

### آنالیز خوراک پایانی خاویاری (FFSt)

| عنوان          | واحد    | FFSt1 | FFSt2 | FFSt3 |
|----------------|---------|-------|-------|-------|
| سایز خوراک     | mm      | 5     | 6.5   | 8.5   |
| پروتئین خام    | %       | 40    | 40    | 40    |
| انرژی قابل هضم | Kcal/Kg | 4200  | 4200  | 4200  |
| چربی کل        | %       | Max   | 18    | 18    |
| فیبر کل        | %       | Max   | 6     | 6     |
| خاکستر کل      | %       | Max   | 14    | 14    |
| فسفر کل        | %       | Min   | 1     | 1     |
| رطوبت          | %       | Max   | 10    | 10    |

### جدول غذادهی خوراک پایانی خاویاری (FFSt)

| وزن ماهی (g)               | 300-800 | 800-1500 | >1500 |
|----------------------------|---------|----------|-------|
| نام خوراک / دما °C         | FFSt1   | FFSt2    | FFSt3 |
| بر اساس اشتها ماهی         |         |          |       |
| <14                        |         |          |       |
| 14-16                      | 1.3     | 0.55     | 0.4   |
| 16-18                      | 1.4     | 0.6      | 0.4   |
| 18-20                      | 1.5     | 0.65     | 0.45  |
| 20-22                      | 1.6     | 0.7      | 0.4   |
| 22-24                      | 1.7     | 0.75     | 0.4   |
| بر اساس اشتها ماهی و ۲۰ آب |         |          |       |
| >24                        |         |          |       |
| دفعات غذادهی               | 4       | 3        | 3     |

- اعداد فوق پیشنهادی بوده و میزان غذادهی با توجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه بروز رسانی گردد
- توصیه های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم ماهی در روز بیان شده است

آدرس کارخانه:

استان البرز . اشتهارد . شهرک صنعتی کوثر

www.btagro.com

آدرس دفتر مرکزی:

تهران میدان توحید . خیابان پرچم . پلاک ۲۹ . طبقه ۴

شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۵۶۱۸۰۳