



- الأتارين والأعلاف الكاملة والمتوازنة وفقاً لاحتياجات الغذائية للروبيان
- زيادة مقاومة الجمبري للأمراض والإجهاد البيئي
- معدلات احتفاظ أعلى مع ضمان النمو
- ثبات عالي في النوم وجودة مياه قابلة للذوبان

تحليل الماكولات للمرحلة الابتدائية من الجمبري (SFSh)

عنوان	واحد	SFSh1	SFSh2	SFSh3
حجم الماكولات	mm	0.4-1.2	1.2	1.5
بروتين خام	CP	44	44	44
طاقة قابلة للهضم	DE	3800	3800	3800
مجموع الدهون	L	12	12	12
مجموع الألياف	CF	7	7	7
رماد الزهرة	Ash	14	14	14
مجموع الفسفور	P	1	1	1
رطوبة	mois	10	10	10

طاولة التغذية الماكولات لمرحلة الابتدائية من الجمبري (SFSh)

وزن الجمبري (g)	1 <	1-3	3-5
اسم الخلاصة	SFSh1	SFSh2	SFSh3
نوع العلف	تنهار	حببيات مضغوطة	حببيات مضغوطة
نسبة التغذية	15-30	6-15	5-6
تواتر التغذية	4-5	4-5	4-5

- الأرقام أعلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقاً لظروف التربية واستراتيجية الإنتاج للمزرعة.
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي.



- تقليل فترة التكاثر مع زيادة إنتاج المحاصيل
- ثبات عالي في الأعلاف والحفاظ على الماء

- ضمان معدل نمو مرتفع مع نسبة تحويل العلف (FCR)
- زيادة مقاومة الجمبري للأمراض والضغط البيئية

تحليل الماكولات لمرحلة نمو من الجمبري (GFSh)

عنوان	واحد	GFSh1	GFSh2
حجم الماكولات	mm	1.8	2
بروتين خام CP	%	42	42
طاقة قابلة للهضم DE	Kcal/Kg	3800	3800
مجموع الدهون L	%	Max	12
مجموع الألياف CF	%	Max	7
رماد الزهرة Ash	%	Max	14
مجموع الفسفور P	%	Min	1
رطوبة mois	%	Max	10

طاولة التغذية الماكولات لمرحلة نمو من الجمبري (GFSh)

وزن الجمبري (g)	5-8	8-12
اسم الخلاصة	GFSh1	GFSh2
نوع العلف	حبيبات مضغوطة	حبيبات مضغوطة
نسبة التغذية	4-5	3-4
تواتر التغذية	4-5	3-4

- الأرقام أعلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقاً لظروف التربية واستراتيجية الإنتاج للمزرعة
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي



- تقليل فترة التكاثر مع زيادة إنتاج المحاصيل
- ثبات عالي في الأعلاف والحفاظ على الماء

- ضمان معدل نمو مرتفع مع نسبة تحويل العلف (FCR)
- زيادة مقاومة الجمبري للأمراض والضغط البيئية

تحليل الماكولات للمرحلة النهائية من الجمبري (FFSh)

عنوان	واحد	FFSh1	FFSh2
حجم الماكولات	mm	2.2	2.5
بروتين خام CP	%	40 ± 2	40
طاقة قابلة للهضم DE	Kcal/Kg	3800 ± 200	3800
مجموع الدهون L	%	Max	12
مجموع الألياف CF	%	Max	7
رماد الزهرة Ash	%	Max	14
مجموع الفسفور P	%	Min	1
رطوبة mois	%	Max	10

طاولة التغذية الماكولات لمرحلة النهائية من الجمبري (FFSh)

وزن الجمبري (g)	12-18	<18
اسم الخلاصة	FFSh1	FFSh2
نوع العلف	حبيبات مضغوطة	حبيبات مضغوطة
نسبة التغذية	2.5-3	1.8-2.5
تواتر التغذية	3-4	3-4

- الأرقام أعلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقاً لظروف التربية واستراتيجية الإنتاج للمزرعة.
- توصيات التغذية بناءً على حجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقرر الرئيسي.