

- زيادة مقاومة الأحداث للأمراض والإجهاد البيئي لنمو أسرع
- نمو أسرع، و نسبة تحويل أقل للأعلاف وتقليل نفايات الإخراج
- الأعلاف الأولية والكاملة والمتوازنة وفقاً لمتطلبات تغذية الأسماك
- معدل بقاء أعلى جنباً إلى جنب مع ضمان النمو الأمثل


تحليل العلف الاولي تيلابيا (SFTi)

عنوان	واحد	SFTi0	SFTi1	SFTi2
حجم الماكولات	mm	0.4-1.2	1.7	2.2
بروتين خام	%	40	40	40
طاقة قابلة للهضم	Kcal/Kg	3600	3600	3600
مجموع الدهون	%	Max	14	14
مجموع الألياف	%	Max	7	7
رماد الزهرة	%	Max	14	14
مجموع الفسفور	%	Min	1	1
رطوبة	%	Max	10	10

طاولة طعام علف الاولي تيلابيا (SFTi)

مقدار السمك (g)	0.5	0.5-8	8-20
اسم الماكول / درجة حرارة C°	SFTi0	SFTi1	SFTi2
بناء على شهية الأسماك			
14-17			
17-19	2.1	1.7	1.4
19-21	3.1	2.4	1.9
21-23	4.4	3.4	2.7
23-25	5.5	4.2	3.3
25-27	6.3	4.9	3.8
27-29	8.5	6.5	5
29-31	7.9	6.1	4.7
31-33	4.5	3.5	2.7
33-35	1.9	1.5	1.2
بناء على شهية الأسماك و O2 الماء			
35 <			
دفعات التغذية	10 <	8-10	8-10

- الأرقام أعلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقاً لظروف التربية واستراتيجية الإنتاج للمزرعة
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي



- تغذية كاملة ومتوازنة بما يتوافق مع الاحتياجات الغذائية للأسماك
- زيادة معدل النمو. تقليل نسبة تحويل العلف (FCR) وتقليل فترة التكاثر
- ترقية المثلى وتعزيزها بالمنشطات المناعية لتقوية ردود الفعل الدفاعية للجسم
- مستويات عالية من الفيتامينات والمعادن والفوسفوليبيد لمقاومة التغيرات البيئية

تحليل علف النمو تيلابيل (GFTi)

عنوان	واحد	GFTi1	GFTi2
حجم المأكولات	mm	3	4
بروتين خام	%	36	36
طاقة قابلة للهضم	Kcal/Kg	3600	3600
مجموع الدهون	%	16	16
مجموع الألياف	%	7	7
رماد الزهرة	%	14	14
مجموع الفسفور	%	1	1
رطوبة	%	10	10

طاولة طعام علف نمو تيلابيل (GFTi)

مقدار السمك (g)	20-50	50-100
اسم الماكول / درجة حرارة C°	GFTi1	GFTi2
بناء على شهية الأسماك		
14-17		
17-19	1	0.85
19-21	1.3	1.1
21-23	1.8	1.4
23-25	2.2	1.6
25-27	2.9	2
27-29	3.8	2.5
29-31	3.6	2.4
31-33	2.1	1.4
33-35	0.9	0.6
بناء على شهية الأسماك و O2 الماء		
35 <		
دفعات التغذية	6	5

- الأرقام أعلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقاً لظروف التربية واستراتيجية الإنتاج للمزرعة
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي

عنوان مصنع:

مدينه البرز اشتهازد. مدينة كوثر الصناعية

www.btagro.com

يكون عنوان المكتب المركزي:

في طهران هو ميدان التوحيد. شارع پرچم. رقم ٢٩. الطابق الرابع

رقم الاتصال: ٠٢١-٦٦٥٦١٨٠٣

- تغذية كاملة ومتوازنة بما يتوافق مع الاحتياجات الغذائية للأسماك
- زيادة معدل النمو. تقليل نسبة تحويل العلف (FCR) وتقليل فترة التكاثر
- ترقية المثلى وتعزيزها بالمنشطات المناعية لتقوية ردود الفعل الدفاعية للجسم
- مستويات عالية من الفيتامينات والمعادن والفوسفوليبيد لمقاومة التغيرات البيئية

تحليل الأعلاف النهائية كافيبار (FFTi)

عنوان	واحد	FFTi1	FFTi2	FFTi3
حجم الماكولات	mm	5	6.5	8
بروتين خام	%	34	34	34
طاقة قابلة للهضم	Kcal/Kg	3600	3600	3600
مجموع الدهون	%	Max	16	16
مجموع الألياف	%	Max	7	7
رماد الزهرة	%	Max	14	14
مجموع الفسفور	%	Min	1	1
رطوبة	%	Max	10	10

طاولة طعام علف النهائي كافيبار (FFTi)

مقدار السمك (g)	100-300	300-500	500<
اسم الماكول	FFTi1	FFTi2	FFTi3
بناء على شهية الأسماك			
14-17			
17-19	0.8	0.8	0.75
19-21	1	0.9	0.85
21-23	1.2	1	0.9
23-25	1.3	1.1	1
25-27	1.6	1.3	1.12
27-29	1.9	1.5	1.3
29-31	1.8	1.35	1.2
31-33	1.1	1	0.9
33-35	0.5	0.5	0.5
بناء على شهية الأسماك و O2 الماء			
35<			
دفعات التغذية	4	3	3

- الأرقام أعلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقاً لظروف التربية واستراتيجية الإنتاج للمزرعة
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي

عنوان مصنع:

مدينة البرز اشتهاارد. مدينة كوثر الصناعية

www.btagro.com

يكون عنوان المكتب المركزي:

في طهران هو ميدان التوحيد. شارع پرچم. رقم ٢٩. الطابق الرابع

رقم الاتصال: ٠٢١-٦٦٥٦١٨٠٣