



سمك السلمون المرقط الابتدائية

- مجموعة بادئ السلمون والأعلاف الكاملة والمتوازنة وفقاً للاحتياجات الغذائية للأسماك
- معدل بقاء أعلى جنباً إلى جنب مع ضمان النمو الأمثل
- زيادة مقاومة الاسماك الصغار للأحداث للأمراض والإجهاد البيئي
- النمو الأسرع، وانخفاض معدل تحويل الماكولات وتقليل النفايات الناتجة

تحليل الماكولات لمرحلة الابتدائية من سمك السلمون (SFT)

عنوان	واحد	SFT00	SFT0	SFT1	SFT2	SFT3	SFT4
حجم الماكولات	mm	0.25-0.4	0.4-0.7	0.7-1.2	1.3	1.7	2.2
بروتين خام CP	% ±2	44	44	44	44	44	44
طاقة قابلة للهضم DE	Kcal/Kg ±200	4100	4100	4100	4100	4100	4100
مجموع الدهون L	% Max	18	18	18	18	18	18
مجموع الألياف CF	% Max	5	5	5	5	5	5
رماد الزهرة Ash	% Max	14	14	14	14	14	14
مجموع الفسفور P	% Min	1	1	1	1	1	1
رطوبة mois	% Max	10	10	10	10	10	10

طاولة التغذية الماكولات لمرحلة الابتدائية من سمك السلمون (SFT)

مقدار السمك (g)	0.25<	0.25-0.7	0.7-2	2-6	6-10	10-15
اسم الماكول / درجة حرارة °C	SFT00	SFT0	SFT1	SFT2	SFT3	SFT4
6-8	3.8	2.8	2.4	2	1.8	1.6
8-10	4.7	4.1	3.4	2.8	3.3	2.3
10-12	5.9	5.1	4.2	3.6	2.6	3
12-14	7.2	6.1	5.2	4.5	4.3	4.1
14-16	7.5	6.2	5.1	4.7	4.5	4.2
16-18	6.2	5	4.2	3.7	3.5	3.1
18-20	5.5	4.4	3.7	3.2	3.1	2.8
دفعات التغذية	10-12	9-11	8-10	7-8	6-7	6-7

- الأرقام أعلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقاً لظروف التربية واستراتيجية الإنتاج للمزرعة.
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي.



- مأكولات والتغذية الكاملة والمتوازنة وفقاً للاحتياجات الغذائية للأسماك
- تطويرها المعدل نمو مرتفع مع نسبة تحويل علف منخفضة وتقليل الفاقد
- الحفاظ على جودة المياه وإمكانية كثافة عالية
- وتربية محسنة بمحفزات السلامة لتعزيز نظام الدفاع

تحليل المأكولات لمرحلة نمو من سمك السلمون (GFT)

عنوان	واحد	GFT1	GFT2
حجم المأكولات	mm	3	4
بروتين خام	%	42	42
طاقة قابلة للهضم	Kcal/Kg	4200	4200
مجموع الدهون	%	18	18
مجموع الألياف	%	6	6
رماد الزهرة	%	14	14
مجموع الفسفور	%	1	1
رطوبة	mois	10	10


وقت التغذية لتحقيق أقصى نمو (Max Growth)

مقدار السمك (g)	15-30	30-70
اسم الماكول / درجة حرارة C°	GFT1	GFT2
8-10	1.9	1.9
10-12	2.5	2.5
12-16	3.4	3.4
16-18	3.2	3.2
18-20	2.2	2.2
دفعات التغذية	4-5	4-5

جدول التغذية لعامل التحويل الأمثل (Optimal FCR)

مقدار السمك (g)	15-30	30-70
اسم الماكول / درجة حرارة C°	GFT1	GFT2
8-10	1.1	1.1
10-12	1.4	1.4
12-14	1.6	1.6
14-16	1.7	1.7
16-18	1.6	1.6
18-20	1.5	1.5
دفعات التغذية	4-5	4-5

- الأرقام أعلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقاً لظروف التربية واستراتيجية الإنتاج للمزرعة
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي



- مأكولات والتغذية الكاملة والمتوازنة وفقاً للاحتياجات الغذائية للأسماك
- تطويرها المعدل نمو مرتفع مع نسبة تحويل علف منخفضة وتقليل الفاقد
- الحفاظ على جودة المياه وإمكانية كثافة عالية
- وتربية محسنة بمحفزات السلامة لتعزيز نظام الدفاع

تحليل المأكولات للمرحلة النهائية من سمك السلمون (FFT)

عنوان	واحد	FFT1	FFT2	FFT3
حجم المأكولات	mm	5	7.5	9.5
بروتين خام	CP	38	38	38
طاقة قابلة للهضم	DE	4200	4200	4200
مجموع الدهون	L	18	18	18
مجموع الألياف	CF	6	6	6
رماد الزهرة	Ash	14	14	14
مجموع الفسفور	P	1	1	1
رطوبة	mois	10	10	10

وقت التغذية لتحقيق أقصى نمو (Max Growth)

جدول التغذية لعامل التحويل الأمثل (Optimal FCR)

مقدار السمك (g)	70-200	200-500	500 >
اسم الماكول / درجة حرارة C°	FFT1	FFT2	FFT3
8-10	1.6	1.4	1
10-12	2	1.7	1.3
12-14	2.2	1.9	1.5
14-16	2.5	2.1	1.6
16-18	2.3	1.9	1.5
18-20	1.6	1.4	1
دفعات التغذية	3-4	3-4	3-4

مقدار السمك (g)	70-200	200-500	500 >
اسم الماكول / درجة حرارة C°	FFT1	FFT2	FFT3
6-8	0.7	0.5	0.42
8-10	1	0.7	0.6
10-12	1.3	1	0.9
12-14	1.5	1.3	1.2
14-16	1.5	1.3	1.2
16-18	1.2	1	0.9
18-20	1.1	0.8	0.7
دفعات التغذية	3-4	3-4	3-4

- الأرقام أعلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقاً لظروف التربية واستراتيجية الإنتاج للمزرعة
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي