



- زيادة معدل النمو مع تقليل الخداع في تحويل العلف (FCR)
- زيادة مقاومة الأسماك للأمراض والإجهاد الوحدة البيئية

- التغذية الكاملة والمتوازنة وفقًا لاحتياجات الأسماك
- الغذائية ومعدل بقاء أعلى جنبًا إلى جنب مع ضمان النمو الأمثل


التحليل العلف الابتدائي كبور (SFC)

عنوان	واحد	SFC0	SFC1	SFC2
حجم الماكولات	mm	0.2-0.7	0.7-1.7	1.7-2.5
بروتين خام	%	±2	40	40
طاقة قابلة للهضم	Kcal/Kg	±200	3500	3500
مجموع الدهون	%	Max	12	12
مجموع الألياف	%	Max	7	7
رماد الزهرة	%	Max	14	14
مجموع الفسفور	%	Min	0.9	0.9
رطوبة	%	Max	10	10

طاولة طعام علف الابتدائي كبور (SFC)

مقدار السمك (g)	0-5	5-10	10-20
اسم الماكول / درجة حرارة C°	SFC0	SFC1	SFC2
<12	<3.6	<2	<1.8
12-14	4.2	2.6	2.5
14-16	4.9	3.6	3.4
16-18	5.8	3.9	3.6
18-20	6.9	4.6	4.3
20-22	7.8	5.3	5
22-24	8.5	5.7	5.4
24-26	8.3	5.5	5.3
>26	بناء على شهية الأسماك و 02 الماء		
دفعات التغذية	10	8-10	8-10

- الأرقام أعلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقًا لظروف التربية واستراتيجية الإنتاج للمزرعة
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي



- بناءً على السلالات المحلية و عناصر العلف داخل البلاد
- ترقية باستخدام المنشطات المناعية لتقوية ردود الفعل الدفاعية للجسم

- علف كامل ومتوازن وفقاً للاحتياجات الغذائية للأسماك
- تقليل الفاقد والحفاظ على جودة المياه وإمكانية تكاثر عالي

التحليل العلف النمو كبور (GFC)


عنوان	واحد	GFC1	GFC2
حجم الماكولات	mm	3	4
بروتين خام CP	%	34	34
طاقة قابلة للهضم DE	Kcal/Kg	3600	3600
مجموع الدهون L	%	12	12
مجموع الألياف CF	%	7	7
رماد الزهرة Ash	%	14	14
مجموع الفسفور P	%	0.9	0.9
رطوبة mois	%	10	10

طاولة طعام علف النمو كبور (GFC)

مقدار السمك (g)	20-50	50-100
اسم الماكول / درجة حرارة C°	GFC1	GFC2
<12	1.1	0.9
12-14	1.7	1.1
14-16	2.3	1.7
16-18	2.9	2
18-20	3.4	2.6
20-22	4	3.2
22-24	4.6	3.7
24-26	5.3	4.3
>26	بناءً على شهية الأسماك و O2 الماء	

دفعات التغذية 4-6 4-6

- الأرقام أعلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقاً لظروف التربية واستراتيجية الإنتاج للمزرعة
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي



- تغذية كاملة ومتوازنة وفقاً للاحتياجات الغذائية للأسماك
- تقليل معدل تحويل العلف (FCR) وتحقيق أوزان عالية في وقت أقصر
- ثبات عالٍ للأعلاف والحفاظ على جودة المياه
- ترقية المثلى وتعزيزها بالمنشطات المناعية تقوية ردود الفعل الدفاعية للجسم

التحليل العلف النهائي كبور (FFC)

عنوان	واحد	FFC1	FFC2	FFC3
سائز خوراك	mm	5	6.5	8.5
بروتين خام	%	32	32	32
انرژى قابل هضم	Kcal/Kg	3600	3600	3600
جرى كل	%	Max	12	12
فيبر كل	%	Max	7	7
خاكستر كل	%	Max	14	14
فسفر كل	%	Min	0.9	0.9
رطوبة	%	Max	10	10

طاولة طعام علف النمو كبور (FFC)

مقدار السمك (g)	100-200	200-500	>500
اسم الماكول	FFC1	FFC2	FFC3
درجة حرارة C°			
<12	0.7	0.6	0.5
12-14	0.9	0.7	0.6
14-16	1.1	0.9	0.8
16-18	1.4	1.1	0.9
18-20	1.7	1.4	1.3
20-22	2	1.7	1.5
22-24	2.6	2	1.8
24-26	3.2	2.3	2.1
>26			بناء على شهية الأسماك و O2 الماء
دفعات التغذية	2-3	2-3	2-3

- الأرقام أعلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقاً لظروف التربية واستراتيجية الإنتاج للمزرعة
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي